

NAUJOS IR RETOS DRUGIŲ RŪŠYS, SUGAUTOS FEROMONINĖMIS GAUDYKLĖMIS, LIETUVOJE

Henrikas Ostrauskas

Valstybinė augalų apsaugos tarnyba, Pelesos 85, Vilnius LT-11351, vaathe@vaat.lt

Viliojant lytiniais atraktantais karantininius drugius (bulvinė kandis, juostuotoji anarsija, rytinis vaisėdis, pietinis lapsukis, amerikinė meškutė, gelsvapilkis saulinukas, pietinis, kukurūzinis ir afrikinis dykrinukai), 1998-2003 metais į feromonines gaudyklės pakliuvo 5 anksčiau neregistruotos rūšys Lietuvoje. Tai pietinis lapsukis - *Cacoecimorpha pronubana* (Hübner) - buvusi karantininė rūšis, uosinė pamenė - *Pammene suspectana* (Linieg et Zeller), gumbinė pamenė - *Pammene giganteana* (Peyerimhoff), skersajuostė plačiasparnė elachista - *Elachista unifasciella* (Haworth), šviesioji kandis - *Niditinea striolella* (Matsumura). Gaudyklėse aptiktos 46 mūsų šalyje retos drugių rūšys, kurių paplitimas papildytas naujais duomenimis. Tai 3 rūšys keršujų kandelių (Gracillariidae), 4 rūšys taškuotųjų kandžių (Yponomeutidae), 2 rūšys šydinių kandžių (Ypsolophidae), 3 rūšys depresarijų (Depressariidae), 1 rūšis didžiųjų čiuopiklinių kandžių (Chimabachidae), 1 rūšis plačiasparnių čiuopiklinių kandžių (Oecophoridae), 2 rūšys makštikandžių (Coleophoridae), 4 rūšys pjautasparnių čiuopiklinių kandžių (Gelechiidae), 1 rūšis stiklasparnių (Sesiidae), 15 rūšių lapsukių (Tortricidae), 3 rūšys ugniukų (Pyralidae), 1 rūšis sprindžių (Geometridae), 5 rūšys pelėdgalvių (Noctuidae), 1 rūšis nolijų (Nolidae). Iš jų žirninis mėnuliškasis vaisėdis - *Cydia lunulana* (Denis et Schiffermüller) buvo registruotas Lietuvoje prieš kelis dešimtmečius, o juostuotoji anarsija - *Anarsia lineatella* (Zeller) – buvusi karantininė rūšis.

NEW AND RARE MOTH SPECIES, CAUGHT BY PHEROMONE TRAPS, IN LITHUANIA

by **Henrikas Ostrauskas**

Lithuanian State Plant Protection Service, Pelesos 85, Vilnius LT-11351, vaathe@vaat.lt

While using sex attractants for quarantine moths (potato tuber moth, peach twig borer, oriental fruit moth, Mediterranean carnation leafroller, American white moth, American bollworm, southern armyworm, fall armyworm, Egyptian cotton leafworm), during 1998-2003 were trapped 5 species earlier not registered in Lithuania. They were Mediterranean carnation leafroller - *Cacoecimorpha pronubana* (Hübner) - former quarantine species, leaf rollers *Pammene suspectana* (Linieg et Zeller) and *Pammene giganteana* (Peyerimhoff), dwarf *Elachista unifasciella* (Haworth) and clothes moth *Niditinea striolella* (Matsumura). There were detected 46 rare in our country moth species and their distribution was supplemented with the new data. Three species belonged to slenders (Gracillariidae), 4 - to ermine moths (Yponomeutidae), 2 - to flat-bodied moths (Depressariidae), 1 - to chimabachids (Chimabachidae), 1 - to concealer moths (Oecophoridae), 2 - to coleophorids (Coleophoridae), 4 - to twirler moths (Gelechiidae), 1 - to clear wings (Sesiidae), 15 - to leaf rollers (Tortricidae), 3 - to pyralid moths (Pyralidae), 1 - to inchworm moths (Geometridae), 5 - to cutworms (Noctuidae), 1 - to nolids (Nolidae). Among them leaf roller *Cydia lunulana* (Denis et Schiffermüller) was registered only a few decennials ago, and peach twig borer - *Anarsia lineatella* (Zeller) – former quarantine species.